



**Reglement
Farmaceutische zorg
2018**

Algemeen

Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 34 Geneesmiddelen en 35 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2018 van Promovendum Ruime Keuze.

In dit Reglement farmaceutische zorg vind je:

- een overzicht van de geneesmiddelen waarvoor je onze voorafgaande toestemming nodig hebt;
- een overzicht van de maximale afleverhoeveelheden.

Overzicht van geneesmiddelen waarvoor je voorafgaande toestemming nodig hebt

Voor alle geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering zijn nadere voorwaarden van toepassing. Voor een aantal van deze geneesmiddelen heb je onze voorafgaande toestemming nodig. In artikel 34 van de verzekeringsvoorwaarden vind je hoe je toestemming kunt vragen. Het gaat om de volgende geneesmiddelen:

Albiglutide
Alirocumab
Ambrisentan
Apixaban
Boceprevir
Bosentan
Dabigatran
Darbepoetine
Dornase alfa
Dulaglutide
Edoxaban
Eltrombopag
Epoprostenol iv
Erytroëetine-alfa
Erytroëetine-beta
Erytroëetine-zeta
Everolimus 0,25mg of 0,75mg
Evolocumab
Exenatide
Fampridine
Febuxostat
Fingolimod
Granulocyt koloniestimulerende faktor
Iloprost voor inhalatie
Imiglucerase
Interferon-alfa
Ivabradine
Ivacaftor
Linaclotide
Liraglutide
Lixisenatide

Macitentan
Miglustat
Nintedanib
Parathyroïd hormoon
Pirfenidon
Rifaximine
Riociguat
Rivaroxaban
Romiplostim
Rufinamide
Sacubitril/valsartan
Selexipag
Sildenafil
Sirolimus
Tadalafil
Tafamidis
Telaprevir
Teriparatide
Ticagrelor
Topotecan capsule
Trepstinil sc/iv
Velaglucerase

Overzicht van maximale afleverhoeveelheden

Per voorschrift heb je maximaal aanspraak op (vergoeding van) geneesmiddelen voor een periode van:

- 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking bij nieuw voorgeschreven geneesmiddelen.
- Maximaal één maand bij geneesmiddelen waarvan de kosten meer bedragen dan € 1.000 per maand, gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden).
- Maximaal 3 maanden bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen.
- Maximaal 15 dagen bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase). Er is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten).